

一般・消化器外科記録

No. 2003・8・18

血液型

手術日 2003・8・18 術後 3 日 術式


Wa 反応() Hb

①麻薬施用の際は必ず三側表に品名、量、施用者サインを。②指示は必ず経過録又は指示書にDr名を記入し指示して下さい。

BP	R	P	T	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
X	●	×	○																	
200	80	180	42																	
180	70	160	41																	
160	60	140	40																	
140	50	120	39																	
120	40	100	38																	
100	30	80	37																	
80	20	60	36																	
60	10	40	35																	
補液	経口 ml																			
	中心静脈 ml																			
	ml																			
	ml																			
	輸血 ml																			
尿	量 ml																			
	比重																			
	尿糖																			
	ケトン体																			
排泄	胃ゾンデ ml																			
	Tチューブ ml																			
	尿量																			
	便																			
検査	血糖																			
	中心静脈圧																			
麻薬	麻薬施用者印																			
処置																				
経過																				
Signature																				

Rh	医師連絡先
() Hb抗原()	

21 22 23 24 1 2 3 4 5 6



MAP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

MAP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

470

VC
Fig 2
MV
RR 20

VC
Fig 2
MV
RR 20

氏名 河原文江	男・女 才	医師指示
I D	主治医 原田 DV	病棟 10B
実施日 15 年 8 月 18 日	婦長印	薬剤印
		医事印

サイン 指 示

① FFP 10u
② PC 30u
③ FFP 10u
④ MAP 10u.

1720h) 1720h 1720h
1720h) 1720h 1720h

1720h) 1720h 1720h

治療・看護の要点

1720h) 1720h 1720h

斗雲

2003.8.19

手術日 2003.8.18

術式


Wa 反応() Hb

① 麻薬施用の際は必ず三側表に品名、量、施用者サインを。
② 指示は必ず経過録又は指示書にDr名を記入し指示して下さい。

金沢医科大学病院

(消外-特1号)

Rh	医師連絡先
() Hb抗原()	



氏名	河原文江	男・女	57才	医師指示
I D	0.9.9.20.7.1			
主治医	原田DR	病棟	10B	婦長印 薬剤印 医事印
実施日	2003年 8月 18日			
サイン	Dr NS	指	示	

検査結果 2003/08/19 06:00
 RBC: $6.88 \times 10^6/\mu\text{l}$, Hb: 20.7 g/dl
 Ht: 60.1 %, MCV: 87.3 fl, MCH: 30.0 pg
 MCHC: 34.4 %, WBC: $10.28 \times 10^3/\mu\text{l}$
 PLTS: $78 \times 10^3/\mu\text{l}$, Na: 168 mEq/l
 K: 3.7 mEq/l, Cl: 106 mEq/l, Ca: 6.6 mg/dl
 BUN: 13 mg/dl, クレアチニン: 0.80 mg/dl
 総タンパク: 3.8 g/dl, 総ビリルビン: 1.8 mg/dl
 直接ビリルビン: 0.7 mg/dl, LDH: 1037 U/l
 AST: 142 U/l, ALT: 47 U/l, CK: 389 U/l
 アミラーゼ: 1198 U/l, グルコース(ブレイ): 562 mg/dl

検査結果 2003/08/19 08:00
 アミラーゼ: 2.4 g/dl, TTT: 0.9 U, ZTT: 3.7 U
 γ-GTP: 16 U/l, ALP: 127 U/l, LAP: 80 U/l

検査結果 2003/08/19 08:01
 RBC: $1.43 \times 10^6/\mu\text{l}$, Hb: 4.4 g/dl
 Ht: 12.3 %, MCV: 85.7 fl, MCH: 30.4 pg
 MCHC: 35.5 %, WBC: $8.17 \times 10^3/\mu\text{l}$
 PLTS: $33 \times 10^3/\mu\text{l}$, Na: 160 mEq/l
 K: 2.8 mEq/l, Cl: 100 mEq/l, Ca: 7.4 mg/dl
 BUN: 17 mg/dl, クレアチニン: 1.61 mg/dl
 総タンパク: 4.0 g/dl, 総ビリルビン: 1.3 mg/dl
 直接ビリルビン: 0.4 mg/dl, LDH: 760 U/l
 AST: 199 U/l, ALT: 202 U/l, CK: 324 U/l
 アミラーゼ: 1240 U/l, グルコース(ブレイ): 408 mg/dl

117.7777...

<S>
 検査結果 2003/08/19 16:30
 RBC: $4.00 \times 10^6/\mu\text{l}$, Hb: 12.0 g/dl
 Ht: 33.6 %, MCV: 84.1 fl, MCH: 30.0 pg
 MCHC: 35.7 %, WBC: $8.14 \times 10^3/\mu\text{l}$
 PLTS: $96 \times 10^3/\mu\text{l}$

<ニ>
 検査結果 2003/08/19 22:00
 RBC: $4.42 \times 10^6/\mu\text{l}$, Hb: 13.2 g/dl
 Ht: 37.2 %, MCV: 84.2 fl, MCH: 29.8 pg
 MCHC: 35.4 %, WBC: $6.70 \times 10^3/\mu\text{l}$
 PLTS: $87 \times 10^3/\mu\text{l}$, Na: 165 mEq/l
 K: 3.1 mEq/l, Cl: 114 mEq/l, Ca: 7.4 mg/dl
 BUN: 18 mg/dl, クレアチニン: 1.21 mg/dl
 総タンパク: 4.9 g/dl, 総ビリルビン: 2.2 mg/dl
 直接ビリルビン: 0.6 mg/dl, LDH: 2949 U/l
 AST: 1512 U/l, ALT: 1192 U/l, CK: 909 U/l
 アミラーゼ: 2130 U/l, グルコース(ブレイ): 180 mg/dl
 随化付記3: 弱黄疸

治療・看護の要点